

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Οι προτεινόμενες προδιαγραφές σκευασμάτων διεντερικής διατροφής είναι οι εξής:

1) Εναρξη διεντερικής διατροφής.

Ομοιογενή διαλύματα με αναλογία θερμίδων $\sim 0,5 \text{ kcal/ml}$ χαμηλής ωσμωτικότητας ($< 150 \text{ mOsm/l}$), χωρίς υπολλείματα.

2) Πολυμερή, ομοιογενή διαλύματα με αναλογία θερμίδων 1 kcal/ml , με ωσμωτικότητα περί τη φυσιολογική του πλάσματος $\sim 285\text{-}295 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$ ~ χωρίς υπόλειμα.

3) Ομοιογενή διαλύματα με αναλογία θερμίδων $1,5 \text{ kcal/ml}$, με ωσμωτικότητα $\sim 450 \text{ mOsm/kg H}_2\text{O}$ ελεύθερα λακτόζης και γλουτένης.

Τα σκευάσματα της κατηγορίας 2 και 3 είναι κατάλληλα για τη κάλυψη της πλειονότητας των ασθενών της ΜΕΘ που οι ημερήσιες ανάγκες τους σε γενικές γραμμές έχουν ως εξής:

Πρωτεΐνες $\rightarrow 1,3 \rightarrow 2 \text{ gr/kg}^* \text{ HM}$

Υδατάνθρακες $\rightarrow 2\text{-}5 \text{ gr/kg}^* \text{ HM}$

Λίπη $\rightarrow 0,7\text{-}1 \text{ gr/kg}^* \text{ HM}$

Με απαιτούμενες θερμίδες συνολικά $\approx 25\text{-}35 \text{ gr/kg}^* \text{ HM}$

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ

2) ΔΗΜΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3) ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

Επισυνάπτονται και οι 2 αναφορές του Διευθυντή της ΜΕΘ και μέλους της επιτροπής Κατσούλη Παναγιώτη.